

Vacunació antigripal

Preguntes i respostes

20
20



©2020 Agència de Salut Pública de Barcelona
Tots els drets reservats. No es permet la reproducció total ni parcial de las imatges o textos d'aquesta publicació sense prèvia autorització.
www.aspb.cat/documents/vacunacio-antigripal/

Preguntes i respostes: Vacunació antigripal 2020 de l'[Agència de Salut Pública de Barcelona](http://www.aspb.cat) està subjecta a una llicència de [Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es podentrobar a: <https://www.aspb.cat>

Cita recomanada

Alba Asensio, Sandra Gabarró, Sònia Gil, Laura Ricart i Èlia Díez. Preguntes i respostes: Vacunació antigripal 2020. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2020.

Índex

Presentació _____	4
Grups prioritaris _____	5
Al·lèrgies i intoleràncies _____	6
Embaràs i lactància _____	11
Anticoagulants _____	13
Infància _____	14
Immunodepressió _____	16
Persones viatgeres _____	17
Més informació _____	18

Presentació

Aquest document pretén facilitar el treball dels equips sanitaris relacionats amb la vacunació antigripal. Recull les respostes a les preguntes més freqüents rebudes pel Servei de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV) de Barcelona.



Grups prioritaris

Quins grups de risc cal prioritzar?

D'acord amb les [recomanacions de la campanya de vacunació antigripal 2020-21](#) els moments, els grups de risc a prioritzar i les vacunes a administrar són:

1. Primera setmana d'octubre de 2020:

- Persones **institucionalitzades de 65 anys o més amb** Fluzone-HD® o Chiromas®
- Persones **institucionalitzades menors de 65 anys** amb Vaxigrip Tetra®
- **Personal sanitari** amb Vaxigrip Tetra®

2. Segona setmana d'octubre de 2020 en endavant:

- Persones de **65 anys o més** amb Chiromas®
- Persones **menors de 65 anys amb risc elevat de complicacions** derivades de la grip amb Vaxigrip Tetra®
- Persones que **poden transmetre la grip a d'altres amb risc** alt de presentar complicacions
- **Altres grups** als quals es recomana la vacunació

Al·lèrgies i intoleràncies

Es poden vacunar les persones amb al·lèrgia a l'ou?

Les dues vacunes que s'utilitzen en aquesta campanya (Chiomas® i Vaxigrip Tetra® i Fluzone®) contenen proteïnes d'ou embrionat.

- Cal una valoració mèdica dels riscos i beneficis d'administrar la vacuna.
- L'experiència d'ús de vacuna antigripal en persones amb al·lèrgia a l'ou indica que la probabilitat d'una reacció greu és molt improbable, tot i que s'han comunicat ocasionalment casos d'anafilaxi.
- Per aquest motiu, la vacunació en aquest casos s'ha de fer sempre en un entorn que garanteixi la seguretat davant una reacció anafilàctica, amb professionals capacitats per a fer el tractament i la reanimació cardiopulmonar.

Les persones amb historial d'al·lèrgia a l'ou, basant-se en la simptomatologia patida després d'una exposició prèvia:

1. Sí que es poden vacunar:

- Les persones amb historial d'al·lèrgia a l'ou que només han patit urticària després d'exposar-se a l'ou sí que es poden vacunar amb l'antigripal inactivada.
- Les persones que han patit simptomatologia diferent d'urticària – a excepció del xoc anafilàctic – també es poden vacunar amb l'antigripal inactivada.

2. No es poden vacunar:

- Les persones que han patit una reacció al·lèrgica greu –per exemple, xoc anafilàctic– anterior a la vacuna antigripal, independentment del component sospitós de ser responsable de la reacció. Per aquestes persones s'aconsella la vacuna en cultiu cel·lular.

Les persones intolerants a l'ou es poden vacunar?

Sí que es poden vacunar ja que la intolerància a l'ou en si no és una contraindicació per a vacunar-se de la grip.

Les persones al·lèrgiques a la penicil·lina es poden vacunar amb Chiomas®, Vaxigrip Tetra® i Fluzone®?

Sí que es poden vacunar, ja que les vacunes amb Chiomas® i Vaxigrip Tetra® no contenen penicil·lina. Tot i això, encara que alguna vacuna en contingui, si la persona mai ha patit una reacció anafilàctica greu, la vacunació no estaria contraindicada.

Les persones al·lèrgiques als aminoglicòsids es poden vacunar amb Chiomas® i Vaxigrip Tetra®?

- Les vacunes Chiomas® i Vaxigrip Tetra® sí que contenen kanamicina i neomicina.
- Les vacunes Chiomas® i Vaxigrip Tetra® no contenen estreptomina ni gentamicina.
- Es contraindica la vacunació en les persones que hagin presentat una reacció anafilàctica greu en una administració prèvia d'aquests antibiòtics. La hipersensibilitat cutània a pomades que continguin aquests antibiòtics no contraindica la vacunació.

Les persones al·lèrgiques al tiomersal es poden vacunar amb Chiomas®, Vaxigrip Tetra® i Fluzone?

Sí que es poden vacunar amb Chiomas® i Vaxigrip Tetra® ja que no contenen tiomersal. Aquest component és un conservant que només es fa servir als vials de multidosi.

S'han de notificar les reaccions adverses a les vacunes?


Sí, en cas de reacció adversa o de fallida vacunal (que una vacuna no hagi estat efectiva) cal notificar-ho al Servei de Targeta Groga o bé omplint el document i enviant-lo al Servei de Gestió de Vacunes.

Per conèixer què contenen les vacunes s'han de consultar les fitxes tècniques de Chiomas®, Vaxigrip Tetra® i Fluzone®

Embaràs i lactància

Es poden vacunar les dones que estan alletant?

Sí, no hi ha cap problema en alletar i rebre o haver rebut la vacuna antigripal. L'única vacuna contraïndicada de manera general a les dones que alleten és la de la febre groga, ja que s'ha comprovat que el virus que conté es transmet a través de la llet.



Es pot administrar conjuntament la gammaglobulina anti-D, la antigripal i la dTpa a una dona embarassada ?

Sí. Les vacunes inactivades i les immunoglobulines es poden administrar de forma simultània en diferents llocs anatòmics.

A partir de quin període d'embaràs es pot vacunar amb vacuna antigripal?

Durant qualsevol moment de l'embaràs es recomana administrar la vacuna antigripal.

Anticoagulants

Una persona que pren anticoagulants pot vacunar-se de la grip?

Sí que es poden vacunar els pacients en tractament amb anticoagulants. Es recomana fer-lo per **via subcutània** per evitar el risc d'hematomes musculars.

En els pacients ben controlats amb **tractament anticoagulant oral, la via intramuscular és segura** si es realitza pressió en el punt de la inoculació.

Infància

Es pot vacunar de grip un nounat?

No s'ha d'administrar la vacuna als infants **menors de 6 mesos**.

Fins a quina edat infantil s'ha de vacunar amb dues dosis?

S'han de vacunar amb dues dosis i amb un interval de 4 setmanes els **menors de 9 anys** que es vacunen **per primera vegada**. En les temporades successives s'administrarà una sola dosi.

S'ha de vacunar als infants amb 0,25ml?

Per tal d'evitar riscos d'administrar una dosi inferior durant la manipulació de la vacuna **la dosi de 0,5ml és correcta** i no és necessari vacunar als infants amb 0,25ml.

Quina és la via d'administració pels menors de 12 anys?


Es recomana exclusivament **la via intramuscular** en els menors de 12 anys, ja que la vacuna administrada per via subcutània és més reactiva que per via intramuscular.



Immunodepressió

Una persona immunodeprimida es pot vacunar?

Sí, es recomana la vacunació antigripal anual a totes les persones immunodeprimides. La vacunació també es recomana als contactes domiciliaris i cobra especial importància en els contactes d'infants immunodeprimits menors de 6 mesos perquè no poden ser vacunats.



Persones viatgeres

Una persona vacunada aquest any a l'hemisferi sud, s'ha de tornar a vacunar aquí?

Sí que cal vacunar, ja que la composició de la vacuna antigripal de l'hemisferi sud pot diferir de la de l'hemisferi nord.



Recorda que si és necessari es poden seguir administrant vacunes antigripals fins a la seva caducitat, normalment entre juny i juliol

Més informació

- [Recomanacions Vacunació Antigripal estacional 2020-21](#)
- [Manual de Vacunacions de Catalunya. Capítol 4 Apartat 4.13.](#)
- [Agència de Salut Pública de Catalunya \(ASPCAT\), vacunació antigripal](#)
- [Generalitat de Catalunya, Canal Salut](#)



Promoció de la salut

Connectem


www.aspb.cat