

Manual de gestió del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAAC)

5. Protocol de profilaxi

1. Objecte

Definir la sistemàtica d'actuació que es porta a terme al CAAC per a la prevenció de malalties infeccioses i infecto-contagioses, així com les infestacions per paràsits, en els animals que hi ingressen i mentre hi són allotjats.

Establir el procediment d'actuació a seguir en cas d'aparició d'un brot de malaltia infecciosa o infecto-contagiosa.

2. Camp d'actuació

Tots els animals que ingressen al Centre, per als tractaments inicials. Tots els animals que hi romanen allotjats per als tractaments periòdics, i per a les actuacions puntuals en cas de brot.

3. Comentaris generals

– Els productes que es fan servir al CAAC per a la desparasitació interna dels animals són els següents:

• Gossos:

.....

• Gats:

.....

– Els productes que es fan servir per a la desparasitació externa són:

• Gossos:

.....

• Gats:

.....

– El personal autoritzat per a portar a terme les accions descrites en aquest protocol és el personal del servei veterinari i el personal cuidador.

– Per a la realització de les pràctiques descrites en aquest Protocol és preceptiva la utilització de guants d'un sol ús.

– És preceptiu també el canvi de bata i de botes per al personal del servei veterinari i el personal cuidador quan passi de la zona on romanen animals malalts a la zona d'allotjament d'animals sans.

– Les accions profilàctiques a l'ingrés, així com les efectuades de manera periòdica, seran anotades a l'*expedient individual* de l'animal.

– De la mateixa manera, es farà constar a l'*expedient individual* el resultat de les proves de detecció efectuades a l'ingrés de l'animal.

4. Realització

Control dels factors ambientals

– El control profilàctic del CAAC passa no només per les actuacions sobre els animals que conformen la seva cabana, sinó també sobre els factors ambientals i de maneig, que incideixen de manera important en l'aparició de malalties.

– S'observarà un escrupolós compliment de les mesures de neteja i desinfecció de totes les dependències i annexes del CAAC, seguint el que s'estableix al *Protocol de neteja i desinfecció*, tant pel que fa a la neteja ordinària, com especialment per a la neteja intensiva entre dues ocupacions d'un mateix box.

– Les manipulacions, trasllats, i en general el maneig quotidià dels animals, es farà amb cura d'evitar moviments i situacions que els puguin ocasionar estrès afegit.

– S'evitarà la massificació en la distribució i allotjament dels animals als box.

- L'atenció diària dels animals es realitzarà, sempre que situacions extraordinàries no requereixin el contrari, començant pels cadells i seguint pels adults.
- En aquelles dependències on romanen animals –de manera estable o puntual– que estan situades en l'edifici tècnic-administratiu (zona veterinària i d'hospitalització, per exemple), s'observarà una acurada ventilació diària.

En el moment de l'ingrés

- Tots els animals seran sotmesos a un tractament de profilaxi en el moment del seu ingrés, d'acord amb el que es detalla en el *Protocol d'Ingrés*.
- Aquest tractament consisteix en:
 - Desparasitació interna: administració d'un antiparasitari via oral, segons la dosi indicada pel fabricant.
 - Desparasitació externa: aplicació d'un producte antiparasitari extern, segons la dosi i mode d'aplicació indicat pel fabricant.
- Es faran proves de detecció de determinades malalties a tots els animals que ingressin al Centre, seguint la pauta que es descriu a continuació:
 - Gossos:
 - Detecció de leishmaniosi: mitjançant titulació d'anticossos en sang, amb la utilització d'un kit.
 - Gats:
 - Detecció d'anticossos anti-FeL (virus de leucèmia felina)
 - Detecció d'anticossos anti-FIV (virus d'immunodeficiència felina)
- Tots els animals es vacunaran, segons la pauta indicada a continuació, un cop revisats pel servei veterinari del CAAC i havent descartat aquests la presència de malaltia. Les vacunes que s'aplicaran són les següents:
 - Gossos:
 - Tetravalent (brom, hepatitis infecciosa, parvovirosi i leptospirosi)
 - Trivalent (a cadells en el moment de la seva entrada o a partir del mes i mig d'edat si ingressen abans) (brom, hepatitis infecciosa i parvovirosi)
 - Ràbia
 - Gats:
 - Trivalent (rinotraqueïtis, calicivirosi i panleucopènia felina)
 - Leucèmia felina
 - Ràbia

- El CAAC podrà aplicar altres vacunacions, de manera extraordinària, com a mesura d'urgència davant d'un brot de malaltia infecto-contagiosa contra la que existeix vacuna, si l'evidència científica i la bibliografia ho aconsellen, i com a mesura complementària a les altres previstes en aquest Protocol davant l'aparició de brots.
- El servei veterinari del CAAC aplicarà, si es considera necessari per raons de sanitat animal, la vacuna contra la *tos de les gosses* als animals de llarga estança al Centre, que se'ls aplicarà el primer hivern després del seu ingrés, un cop transcorreguts com a mínim sis mesos des d'aquest.
- Un cop efectuada la revisió a l'entrada (sanitària i comportamental) per part dels serveis veterinaris i efectuades les desparasitacions interna i externa, els animals que ingressin al CAAC passaran un **període de quarantena** –que es determinarà a criteri del servei veterinari– allotjats a una zona destinada a tal efecte, la *zona de quarantena*.
- Un cop passat aquest termini, si no han expressat cap malaltia, se'ls assignarà una gàbia a la *zona d'allotjament*.
- Si durant el *període de quarantena* els animals evidencien una malaltia infecto-contagiosa, seran traslladats a la *zona d'aïllament* per a les actuacions posteriors.

Actuacions periòdiques

- Revacunacions:
 - **Gossos:**
 - **A les 3-4 setmanes de la primera tetravalent (o trivalent en el cas d'un cadell)**, es procedirà a la seva revacunació amb una tetravalent de record.
 - **Anualment** es revacunarà tots els gossos allotjats amb tetravalent i amb la vacuna de la ràbia.
 - **Gats:**
 - **A les 3-4 setmanes de la primera trivalent**, es procedeix a la revacunació dels gats amb una trivalent de record.
 - **Anualment** es revacunarà els gats allotjats amb una trivalent, amb la vacuna de la leucèmia felina, i amb la vacuna de la ràbia.
- Desparasitacions:
 - Es desparasitarà internament i externament els animals allotjats segons la posologia indicada pel fabricant dels productes utilitzats.
 - En qualsevol cas i com a mínim, sempre es desparasitaran externament tots els animals allotjats a la primavera i a l'estiu, com a complement de la desparasitació ambiental prevista al *Protocol de Neteja i Desinfecció*.

Actuacions en el cas d'aparició d'un animal amb presumible malaltia infecto-contagiosa

- Davant d'un animal que presenti simptomatologia compatible amb una malaltia infecciosa o infecto-contagiosa, el personal cuidador que el detecti en donarà part al servei veterinari, utilitzant el *full d'incidències de salut*.
- El servei veterinari procedirà a l'examen de l'animal, i a l'aproximació diagnòstica.
- Davant la possibilitat de tractar-se d'una malaltia infecto-contagiosa, l'animal serà immediatament ubicat a la *zona d'aïllament*.
- Es procedirà a una neteja a fons i posterior desinfecció del box on estigués allotjat fins el moment, amb el desinfectant que habitualment s'utilitzi o altre més específic si el servei veterinari ho valora necessari, segons l'agent etiològic sospitat o confirmat.
- El servei veterinari procedirà al tractament de l'animal malalt, i eventualment a la realització de les proves necessàries per a la confirmació del diagnòstic.
- Si el tractament de l'animal requereix unes cures veterinàries i unes atencions específiques, el servei veterinari, juntament amb el responsable del CAAC, valoraran la conveniència d'incloure l'animal en el *Programa d'acollida externa d'animals amb requeriments especials*, activant el protocol d'actuacions descrit en aquest programa.
- Si es tracta d'un **brot** (és a dir, l'aparició de dos o més casos de la mateixa malaltia), les actuacions a seguir seran les mateixes, posant especial èmfasi en l'aïllament dels animals i en la acurada neteja i desinfecció, no només dels boxes on s'allotgessin els animals, sinó també de les zones comunes i d'esbarjo.
- En aquest cas, i depenent de l'etiologia de la malaltia un cop confirmada, la seva capacitat de propagació, la seva virulència, i la gravetat de la seva expressió al Centre, el servei veterinari, juntament amb el responsable del CAAC, valoraran la conveniència de l'eutanàsia aollint-se al que estableix l'ordenança municipal i el *Protocol d'Atenció Veterinària*.